

แนวทางการดูแลรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็ก

(โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)

"ท้องร่วง" คือภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวมากขึ้น จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้งต่อวัน (สำหรับผู้ป่วยที่มีการอุจจาระบ่อย แต่ลักษณะ อุจจาระเป็นปกติ หรือทารกที่กินนมแม่แล้วถ่ายอุจจาระที่มีลักษณะนิ่มเหลวบ่อย ไม่ถือว่าเป็นท้องร่วง)

☐ TRIAGE Emergency

☐ TRIAGE Urgency

ประวัติ

- ☐ ถ่ายเหลว.....ครั้ง
- ☐ อาเจียน.....ครั้ง
- ☐ ปัสสาวะครั้งสุดท้าย.....ชั่วโมง
- ☐ มีไข้ > 37.8 c
- ☐ Poor intake
- ☐ Revisit

ตรวจร่างกาย

- ☐ General appearance (Active / Look fatigue / Drowsiness / Coma)
- ☐ Sunken eyeball
- ☐ Frontanellle (Full / Depress)
- ☐ Dry lip
- ☐ Skin turgor (Good Fair / Poor)
- ☐ Pulse (Pulseless / Pulse 1+ / Pulse 2+)
- ☐ CRT (<2 sec / 2-3 sec / 73 sec)

ข้อบ่งชี้ในการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล

1. ขาดน้ำรุนแรงหรือช็อก (Severe dehydration or Shock)
2. สงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
3. อาเจียนต่อเนื่องหรือรุนแรงจนไม่สามารถดื่มสารละลายเกลือแร่ได้อย่างเพียงพอ
4. อาเจียนมีน้ำดีปนหรือสงสัยภาวะทางศัลยกรรม
5. ทารกอายุน้อยกว่า 2 เดือน
6. มีความผิดปกติของระบบประสาท เช่น ชิม ชัก เป็นต้น
7. แพทย์ผู้รักษาพิจารณาว่ามีความเสี่ยงหากรักษาที่บ้าน เช่นผู้ป่วยมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น

ข้อบ่งชี้ในการปรึกษากุมารแพทย์

1. ขาดน้ำรุนแรงหรือช็อก(Severe dehydration or Shock)
2. มีภาวะอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น Organ failure
3. ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์